

**គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់អនុវត្តដំណាំគម្របរបស់ដើមក្រចៅ (Crotolaria juncea)
ស្រូវសាលី (Fagopyrum esculentum) ឬស្រូវអារីន (Avena sativa)**

គោលបំណង និងកម្មវត្ថុធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មដំណាំគម្រប :

- បង្កើនគុណភាពដី (បង្កើនសារធាតុសរីរាង្គដី និងសកម្មភាពជីវសាស្ត្រ បង្កើនអតិភាពផ្លូវ បង្កើតប្រភព ឬអាសូតក្នុងវាលជិតផ្ទះ)
- កាត់បន្ថយការហូរច្រោះដី និងកករ ចូលទៅក្នុងស្ទឹងបឹងប្រទេសនៅក្បែរនោះ
- វិធានការណ៍ការពារដំណាំ ដើម្បីកំចាត់ពពួកស្មៅចង្រៃ និងជម្ងឺកើតពីដី
- ទាក់ទាញសត្វល្អិតមានប្រយោជន៍ (សត្រូវធម្មជាតិរបស់សត្វល្អិតចង្រៃ សត្វឃ្មុំ)
- កាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយលើ (ដី ថ្នាំសម្លាប់កត្តាចង្រៃ ឥន្ធនៈ)

ការរៀបចំទីតាំង : រៀបចំវាលដោយដកពពួកស្មៅចង្រៃអោយអស់ សម្អាតដីអាចម៍បំណះ ឬដោយវិធីផ្សេងៗទៀត សម្អាត តំបន់ដែលត្រូវដាំដំណាំគម្របដែលបានជ្រើសរើស ។ ថ្នាំកំចាត់ស្មៅ ដូចជា ផលិតផលក្លីផូសាត អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បី សម្អាតវាលដែលមានពពួកស្មៅចង្រៃមុនធ្វើការដាំដុះដំណាំគម្រប ។ មិនត្រូវដាំដំណាំគម្របក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ ក្រោយ ពីបាញ់ថ្នាំកំចាត់ស្មៅទេ បើមិនដូច្នោះទេ វាអាចបំផ្លាញ ឬធ្វើអោយងាប់ដល់គ្រាប់ពូជដែលទើបចេញពន្លក ។

អត្រាសាបព្រោះ : អត្រាគ្រាប់ក្រចៅ : ៤០ ផោន ក្នុងផ្ទៃដីមួយអេឃី
អត្រាគ្រាប់ស្រូវសាលី : ៦០ ផោន ក្នុងផ្ទៃដីមួយអេឃី
អត្រាគ្រាប់ស្រូវអារីន : ៧០ ផោន ក្នុងផ្ទៃដីមួយអេឃី

ការសាបព្រោះគ្រាប់ : សម្រាប់វាលតូចៗ ឬប្រសិនបើធ្វើដំណាំចន្លោះ គ្រាប់អាចព្រោះដោយដៃ ឬដោយប្រើម៉ាស៊ីនសាប ព្រោះដី/គ្រាប់ដែលប្រើដោយដៃ ។ សម្រាប់វាលធំៗ ការបាចគ្រាប់ដោយគ្រឿងយន្ត (ដោយប្រើត្រាក់ទ័រដាក់ដី/ម៉ាស៊ីន បាចដី/គ្រាប់) និង/ឬការសាបព្រោះជាជួរត្រូវបានប្រើដោយមានការសន្សំសំចៃជាង ។

ការរួមបញ្ចូលគ្នា : វាជាការសំខាន់ដែលមានដីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដោតគ្រាប់ពូជអោយផ្ទាល់ ដូច្នោះវាជាវិធីល្អបំផុតដើម្បី ដាក់បញ្ចូលគ្រាប់បានឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីការបាច ។ ក្នុងវាល ឬជួរតូចៗ ការងារនេះអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់ រនាស់ដែលអូសដោយត្រាក់ទ័រកង់បួន (ត្រាក់ទ័រភូររាស់-ATV) ឬដោយរាស់ដីលើគ្រាប់ ។ នៅតាមវាលធំៗរនាស់ចុន ស្រាលដែលរាស់បានជម្រៅមិនលើសពី ១ អ៊ីញ គប្បីត្រូវបានប្រើប្រាស់ ។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវពេលវេលា និងការស្រោចស្រព : ប្រសិនបើគ្រាប់ពូជត្រូវបានដាំមុនរដូវវស្សា (ពាក់កណ្តាលខែតុលាដល់ ពាក់កណ្តាលខែមេសា) មិនចំបាច់មានការស្រោចស្រពសម្រាប់ដំណាំគម្របខាងលើទេ ។ នៅខែក្នុងរដូវក្តៅស្ងួត គឺចំបាច់ ត្រូវមានការស្រោចស្រព ។ ចំណាំ : នៅពេលដែលក្រចៅត្រូវបានដាំរវាងខែកញ្ញា និងខែធ្នូ វានឹងឆាប់ចេញផ្កា (ជាទូទៅក្នុង រយៈពេល ៦ សប្តាហ៍នៃការដាំ) ។ សម្រាប់ផលិតកម្មគ្រាប់ រយៈពេលនេះត្រូវការជាចំបាច់ ។ ជាងនេះទៅទៀត រុក្ខជាតិ ក្រចៅមានរយៈពេលខ្លីជាង អំឡុងពេលខែកញ្ញា ដល់ខែធ្នូ ដោយសារការឆ្លើយតបចំពោះការចេញផ្កា ។ ក្រចៅដែលដាំ ពីខែមករា ដល់ខែសីហា នឹងមានកម្ពស់ (៥ ហ្វីត ឡើងទៅ) ដែលបង្កើនលទ្ធភាពប្រើប្រាស់របស់ជារាំងទប់ខ្យល់ ។ ស្រូវ សាឡី និងស្រូវអារីន ជាទូទៅ មិនទទួលរងឥទ្ធិពលដោយសារពេលវេលានៃការដាំក្នុងឆ្នាំនោះទេ ។

ការដុះពន្លក និងការដុះចេញ : រយៈពេលដើម្បីដុះចេញគឺប្រហែល ៧ ទៅ ១០ ថ្ងៃ សម្រាប់ប្រភេទទាំងបីនៃដំណាំគម្រប បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងដំបូងលើសពី ០.៥ អ៊ីញ ។ ក្រចៅនឹងដុះចេញពន្លកក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង ។ ស្រូវសាឡី និងស្រូវអារ៉ុន នឹងដុះចេញពន្លកក្នុងរយៈពេល ៧២ ម៉ោង បន្ទាប់ពីទទួលបានសំណើម ។

ការគ្រប់គ្រង : ជាទូទៅ មិនចាំបាច់ត្រូវមានការគ្រប់គ្រងច្រើនទេ ។ នៅពេលដែលដំណាំត្រូវបានដាំ ហើយទទួលបាន សំណើម វិធីសាស្ត្រល្អបំផុតគឺទុកដំណាំគម្របចោល ។ មិនចាំបាច់ដាក់ជី មិនត្រូវការស្រោចស្រព និងមិនបាច់ប្រឹងប្រែងគ្រប់ គ្រងកត្តាចង្រៃទេ ។ បន្ថយការគ្រប់គ្រងលើដំណាំគម្របអោយនៅកម្រិតទាបបំផុត គឺមានន័យថាកាត់បន្ថយផ្ទៃដំណាយដែល ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តអោយនៅកម្រិតទាបបំផុត ដូច្នេះធ្វើអោយវាកាន់តែមានការទាក់ទាញថែមទៀតដល់អ្នកដាំ ។



គម្របស្រូវសាឡី



គ្រាប់ស្រូវសាឡី



គម្របស្រូវអូក



គ្រាប់ស្រូវអូក



ក្រចៅនៅចន្លោះជួរដំណាំល្អុង



គ្រាប់ក្រចៅ