

覆蓋作物準則的執行情況菥蓂 (*Crotolaria* 芥菜) , 蕎麥 (蕎麥) 或燕麥 (燕麥)

覆蓋作物治療目標或目的 :

- 提高土壤質量 (增加土壤有機質和生物活性 , 提高磷的供應 , 生產場源或氮氣)
- 減少土壤侵蝕和沉積到河流和近岸水體
- 蟲害管理控制雜草和土壤傳播的疾病
- 景點的益蟲 (害蟲天敵 , 蜜蜂)
- 減少成本 (化肥 , 農藥 , 燃料)

場地準備 : 準備實地消除任何雜草和覆蓋作物種植面積。除草劑 , 如草甘膦產品 , 可以用來清洗領域之前 , 雜草覆蓋作物種植。覆蓋作物種植不應後 7 天內除草劑應用 , 否則 , 損害或死亡的新興幼苗可能會發生。

播種率 : 蘇恩大麻播種率 : 40 磅/英畝

蕎麥播種率 : 60 磅/英畝

燕麥播種率 : 70 磅/英畝

播種 : 對於小型字段或間作 , 種子可以播放無論是手工或手動播放肥料/種子傳播者。對於較大的種子傳播領域的機械 (拖拉機安裝與化肥/種子傳播者) 和/或種子鑽探可能更為經濟。

法團 : 重要的是 , 有足夠的土壤種子接觸 , 最好是將種子後很快蔓延。在小領域或行 , 這可以通過使用一塊勾花網拖後面 4 惠勒 (全地形車 , 沙灘車) 或耙對土壤的種子。在更大的領域輕耙 , 以不超過 1 英寸厚的建議。

計時與灌溉的要求 : 如果種子種植只是在雨季來臨前 (10 月中旬 , 通過 4 月中旬) , 沒有灌溉是必要的任何上述覆蓋作物。在乾燥的夏季的灌溉需要。注意 : 當南 , 南與種植大麻是在 9 月和 12 月將花很快 (一般 6 週內種植) 。種子生產 , 這是可取的。此外 , 南 , 南麻 , 工廠將在 2008 年 9 月短年 12 月的時間 , 因為開花的反應。蘇恩大麻種植 1 月至 8 月將成為高 (5 英尺 +) , 從而增加其效用作為防風林。蕎麥和燕麥不是 , 一般時間的影響 , 今年玉米播種面積。

萌發及編制 : 編制時間約為 7-10 天 , 所有 3 種類型的覆蓋作物。菥蓂將在 24 小時內發芽。蕎麥 , 燕麥 , 發芽 72 小時內收到的水分。

管理 : 一般沒有很大的完成方面的管理。一旦作物種植和水分收到最好的辦法是離開覆蓋作物單。不施肥 , 不灌溉 , 病蟲害控制 , 沒有作出努力。盡量減少覆蓋作物管理與成本最小的做法 , 從而使其更具吸引力種植者。

• [Buckwheat Cover Buckwheat/Sunn Hemp/Oats Seeds Pictures???](#)